

Hipertensão Arterial Secundária a Cirurgia para Revascularização do Miocárdio

Prezado Senhor Editor:

Em relação ao resumo de literatura publicada na Rev Bras Anest, 1983; 33: 385 que refere-se a Hipertensão secundária à cirurgia para revascularização do miocárdio, rememoro o caso de um distinto colega que é uma das pessoas que mais tem lutado em prol do tratamento da dor no Brasil e América Latina, e relatou intenso sofrimento secundário à esternotomia.

A Literatura médica apresenta múltiplos exemplos de mudanças nas condutas médicas ou aceitação de novas técnicas após experiências vividas por cientistas. Exemplos: Sewelweis após a morte do seu amigo médico legislador Koleschka, introduziu como obrigatoriedade a lavagem das mãos e o calçamento de luvas antes de tocar cada paciente.

O mesmo Wells, após experimentar a anestesia com óxido nítrico em si mesmo.

Poderíamos recordar muitos outros exemplos, seria hora de que os cirurgiões aceitassem o tratamento da dor com morfina peridural no pós-operatório de cirurgia cardíaca em forma rotineira, considerando que são ótimos os resultados obtidos em outros tipos de intervenções.

Tenho boa experiência com o uso desta técnica para tratamento de dor do infarto do miocárdio, porém, nenhuma da cirurgia cardíaca por não ser feita no nosso meio.

Gostaria de poder ler proximamente muitas publicações na nossa revista, relacionada com esta técnica.

Atenciosamente

Carlos M. a Gonzales Picanço, TSA
Casa de Saúde Santana do Livramento S/A
97570 - Sant'Ana do Livramento, RS